薬がわかる本API（medicine）

A)実装例



B)レスポンス例（抜粋）

```
<id>3732</id>
<name>タミフル</name>
<name_kana>たみふる
</name_kana>
```

```
<original>1</original>
<generic>0</generic>
```

```
<price_informations>
<price_information>
<form>カプセル剤</form>
<quantity>75mg</quantity>
<unit>1カプセル</unit>
<price>309.10円</price>
</price_information>
<price_information>
<form>ドライシロップ剤</form>
<quantity>3%</quantity>
<unit>1g</unit>
<price>237.20円</price>
</price_information>
</price_informations>
</small>
```

```
<large>
<uri>
http://api.sociohealth.jp/medicine_files/large/525.jpg
</uri>
<alt>薬画像:525.jpg</alt>
<width>160</width>
<height>81</height>
<content_type>image/jpeg</content_type>
<size>6525</size>
</large>
```

```
<caution>
(1)服用してはいけない場合……本剤の成分に対するアレルギーの前歴
(2)慎重に服用すべき場合……重い腎機能障害
(3)服用目的……①本剤を予防に用いる場合は，原則として，インフルエンザウイルス感染症を発症している人と一緒に住んでいる以下の人を対象とします→65歳以上の高齢者，慢性呼吸器疾患または慢性心疾患をもっている人，糖尿病などの代謝性疾患のある人，腎機能障害のある人。②本剤は，A型・B型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がありません。
(4)服用法……①本剤は，インフルエンザ発症後できるだけ早く服用する必要があります。発症後48時間以上たってからの服用開始では有効性を裏づけるデータはありません。②成人で腎機能障害がある人は，服用量を減らす必要があるので，服用前にその旨を処方医に伝えてください。
(5)その他……
・妊婦での安全性：未確立。有益と判断されたときのみ服用。
・授乳婦での安全性：服用するときは授乳を中止。
・1歳未満での安全性：未確立。<Link ColumnId="1"/>
</caution>
```

```
column_searchAPIを実行してリンクする。
http://api.sociohealth.jp/medicine/column_search.xml?key=xxx&id=1
```